



Comune di Rutigliano

Città Metropolitana di Bari

BASF
We create chemistry

Agrigenius®
Uva

BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 15

Periodo: 25/08 – 31/08

Fase fenologica attuale (vite):

BBCH 91 - 85 (Raccolta – Addolcimento acini)

Elaborazione su base DSS *Agrigenius® Uva* (BASF)

A cura dell'Ufficio Tecnico Agriproject Group


FASE FENOLOGICA

									
Apertura gemme	Foglie distese	Grappoli separati	Bottoni floral separati	Fioritura	Allegagione	Pre chiusura grappolo	Chiusura grappolo	Maturazione acini	Raccolta

VARIETA' TARDIVE										
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

STAZIONI METEO DI RIFERIMENTO

- **Stazione meteo 1:**
Località «*Le Monache*»
Contrada «*Panicelli*»
- **Stazione meteo 2:**
Località «*Pozzo Cannella*»
Contrada «*Cipierno*»



SITUAZIONE COMPLESSIVA

PERONOSPORA (*Plasmopara viticola*)

Il modello **Agrigenius® Uva**, per questa settimana, non segnala nessun rischio infettivo. Le bagnature mattutine possono far partire infezioni che rimangono confinate alla sola foglia o alla vegetazione esterna al vigneto.

OIDIO (*Erysiphe necator*)

Per la settimana in oggetto il modello **Agrigenius® Uva** indica un livello di rischio medio di infezioni conidiche (secondarie). Tale rischio è riferito principalmente al rachide e a gli organi verdi in quanto le bacche hanno perso la suscettibilità al patogeno dall'invaiaatura. Il consiglio rimane sempre quello di valutare le condizioni meteorologiche, le caratteristiche specifiche del proprio vigneto e della zona tenendo conto che le condizioni microclimatiche che si vengono a creare nei vigneti coperti, con un'elevata umidità relativa ed escursione termica di/notte rappresentano un ambiente ottimale per lo sviluppo del fungo. Tuttavia la pericolosità della malattia non si esclude anche nei vigneti sotto rete. Si ricorda che i conidi possono causare infezioni in un ampio intervallo di temperatura e umidità, e sono sfavoriti dalla pioggia.

BOTRITE (*Botrytis cinerea*)

Nella settimana in oggetto, il modello previsionale non indica alcun rischio infettivo.

SITUAZIONE COMPLESSIVA

TIGNOLETTA (*Lobesia botrana*)

Il modello **Agrigenius® Uva** indica incremento delle larve con raggiungimento del picco del loro sviluppo mentre sono in forte diminuzione gli adulti e le ovideposizioni. Contestualizzare il dato di popolazione prevista dal modello con il corretto monitoraggio di campo.

COCCINIGLIE (*Planococcus ficus*)

La **cocciniglia** deve essere costantemente oggetto di monitoraggio in vigneto.


I **monitoraggi di campo** - supportati dalle proiezioni del ciclo biologico fornite dal modello previsionale - forniscono utili **suggerimenti** per l'impostazione della **strategia di difesa**

da mettere in atto.

Il modello **Agrigenius® Uva** prevede incremento degli adulti e diminuzione delle neanidi presenti.

LOCALITÀ 1 – «Le Monache» (C.da Panicelli)


PERONOSPORA



Per la settimana in oggetto il DSS **Agrigenius® Uva** non segnala alcun rischio infettivo.

LOCALITÀ 1 – «Le Monache» (C.da Panicelli)

OIDIO




Per la settimana in oggetto il DSS **Agrigenius® Uva** segnala rischio **medio** di infezioni secondarie. Tale rischio è riferito principalmente al **rachide** e agli **organi verdi** in quanto le bacche hanno perso la suscettibilità al patogeno dal momento dell'invaiaitura.


OIDIO

Nella località considerata, la **pressione infettiva** è **bassa** a livello dei **grappoli ormai invaiati/maturi** mentre per gli **organi verdi**, compreso il **rachide**, è su valori **medi** ma in fase di miglioramento.

Pressione infettiva su grappolo




Pressione infettiva su foglia



LOCALITÀ 1 – «Le Monache» (C.da Panicelli)

BOTRITE




Nella settimana in oggetto, il **DSS Agrigenius® Uva** non segnala alcun rischio infettivo.

TIGNOLETTA

LOCALITÀ 1 «Le Monache» (C.da Panicelli)

3° generazione - Popolazione presente (%)




Secondo il **DSS Agrigenius® Uva**, nella settimana in oggetto, è previsto il raggiungimento del picco di sviluppo delle **larve** e l'**inizio** della fase di **incrisalidamento**.

PLANOCOCCO

LOCALITÀ 1 «Le Monache» (C.da Panicelli)


3° generazione - Popolazione presente (%)



Il modello **Agrigenius® Uva** pronostica per questa settimana **aumento** della presenza degli **adulti** e **diminuzione** delle **forme giovanili**.

LOCALITÀ 2 - «Pozzo Cannella» (C.da Cipierno)


PERONOSPORA



Per la settimana in oggetto il DSS **Agrigenius® Uva** non segnala alcun rischio infettivo.

LOCALITÀ 2 - «Pozzo Cannella» (C.da Cipierno)

OIDIO



Per questa settimana, il DSS **Agrigenius® Uva** indica un livello di rischio basso. Da non escludere che permane la suscettibilità del rachide e degli organi verdi ad essere attaccati dal patogeno.


OIDIO

Nella località considerata, la **pressione infettiva** si attesta su valori **bassi** per i **grappoli** mentre si mantiene su livelli **medi** per tutti gli **organi verdi** compreso il **rachide**.

Pressione infettiva su grappolo




Pressione infettiva su foglia



LOCALITÀ 2 - «Pozzo Cannella» (C.da Cipierno)

BOTRITE




Nella settimana in oggetto, il **DSS Agrigenius® Uva** non segnala alcun **rischio infettivo**.

TIGNOLETTA

LOCALITÀ 2 «Pozzo Cannella» (C.da Cipierno)

3° generazione - Popolazione presente (%)




Secondo il **DSS Agrigenius® Uva**, nella settimana in oggetto, si assisterà all'**incremento** delle **larve** mentre il **volo** degli adulti e le **ovideposizioni** sono in **diminuzione**. È previsto l'inizio della fase di incrisalidamento.

PLANOCOCCO

LOCALITÀ 2 «Pozzo Cannella» (C.da Cipierno)

3° generazione - Popolazione presente (%)



Il modello **Agrigenius® Uva** pronostica per questa settimana **incremento** della presenza degli **adulti** e **diminuzione** delle **neanidi** presenti.